



Información para el paciente: Amoxicilina 500-mg - *Cápsula oral [pastillas]* Amoxicilina - *Suspensión oral*

Spanish translation of: Patient Information: Amoxicillin 500-mg Oral Capsules (Pills) Amoxicillin Oral Suspension (<http://emergency.cdc.gov/agent/anthrax/treatment/amoxicillinpatient.asp>)

Tome esta medicina como lo indica la receta.

La amoxicilina pertenece a la clase de medicamentos llamados antibióticos penicilínicos. La misma ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration o FDA) para tratar a las personas con infecciones causadas por ciertos tipos de bacteria. La amoxicilina no ha sido aprobada por la FDA para su uso en el tratamiento de personas expuestas a las esporas del carbunco (ántrax). Sin embargo, si los resultados de los estudios muestran que se puede eliminar la bacteria con los antibióticos penicilínicos, se recomendará el uso de la amoxicilina para prevenir la enfermedad del carbunco (ántrax) en las personas expuestas al carbunco (ántrax), cuando el uso de otros antibióticos no sean recomendado como en el caso de los niños y las mujeres embarazadas.

Cómo tomar la amoxicilina

ADULTOS: tome una pastilla tres veces al día.

NIÑOS: las dosis para los niños dependen de su peso. Déle la medicina a su hijo de acuerdo con las instrucciones del médico.

Tome amoxicilina con un vaso grande de agua. Esta medicina puede ser tomada con alimentos o sin ellos. Tomar esta medicina con alimentos reduce la posibilidad de sentir malestar estomacal. Si se le olvida tomar una de las dosis, empiece de nuevo a tomar una pastilla tres veces al día. No tome 2 pastillas por la dosis que olvidó tomar. Tómese todas las pastillas, aun si se siente bien, a menos que el médico le diga que deje de tomarlas. Si deja de tomar esta medicina antes de tiempo, podría sentirse mal.

Efectos secundarios

Los efectos secundarios más comunes que causa la amoxicilina son malestar estomacal, vómito y diarrea. Si usted tiene problemas con cualquiera de estos síntomas, hable con su médico.

Las reacciones alérgicas son muy poco comunes. Los signos de una reacción alérgica pueden ser sarpullido, comezón, inflamación de la lengua, las manos y los pies, fiebre, y dificultad para respirar. Si presenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato.

Precauciones

- Asegúrese de informar a su médico si usted es alérgico a alguna medicina.
- Es muy importante que le diga al médico los nombres de TODAS las medicinas que está tomando actualmente, incluidas las pastillas que compró en la tienda como, por ejemplo, vitaminas y antiácidos.
- Dígale a su médico si tiene asma, una afección que causa problemas para respirar, o cualquier otro tipo de enfermedad.
- Es probable que las pastillas anticonceptivas no sean tan efectivas si está tomando esta medicina. Use condones u otro tipo de anticonceptivo hasta que concluya el tratamiento en su totalidad.
- La amoxicilina puede tomarse sin problema durante el embarazo, sin embargo, asegúrese de decirle al médico que está embarazada.
- En las mujeres, la amoxicilina puede causar comezón y flujo vaginales, lo cual se conoce comúnmente como candidiasis. Si esto ocurre, dígaselo al médico.

Para más información, visite <http://emergency.cdc.gov/agent/anthrax/espanol/>, o llame a los CDC al 800-CDC-INFO (español e inglés) o 888-232-6348 (TTY).